


- Применение **Кантарен®** профилактическими курсами в течение 3-4 недель 1 раз в квартал, снижает риск возникновения рецидивов мочекаменной болезни у животных.
- При регулярном приеме **Кантарен®** восстанавливаются функции почек и нормализуется работа мочевыделительной системы.
- Назначение **Кантарен®** необходимо всем животным, у которых были отмечены случаи клинического проявления мочекаменной болезни.



Группа компаний «Хелвет»  
Телефон для консультаций:  
8-800-333-32-63  
e-mail: [info@helvet.ru](mailto:info@helvet.ru)  
web: [www.helvet.ru](http://www.helvet.ru)

# кантарен®

Пероральная форма препарата в каплях  
делает удобным его применение  
в домашних условиях

необходим

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЦИСТИТА  
И ПРОФИЛАКТИКИ  
МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ

## Симптомы цистита у собак

- Учащенные позывы на мочеиспускание с малым количеством выделяющейся мочи
- Болезненность в области мочевого пузыря
- Наличие примесей крови или гноя в последних порциях мочи

Если вовремя не начать лечение, состояние собаки ухудшается:

- Животное становится вялым и апатичным
- Интенсивность боли при мочеиспускании возрастает
- Температура тела может резко повыситься
- Возможно распространение инфекции из мочевого пузыря в почки с последующим развитием пиелонефрита

## Рекомендуемые действия

Посетить ветеринарного врача. При постановке диагноза важно исключить мочекаменную болезнь, пиелонефрит и некоторые другие заболевания

## Лечение

Как правило, для лечения назначается сразу несколько разных препаратов:

- для купирования воспалительного процесса
- для устранения спазма уретры
- для увеличения мочевыделения

**Кантарен®** разработан специально для терапии заболеваний мочевыводящей системы, он оказывает комплексное воздействие и способен заменить собой несколько препаратов.

**Кантарен®** обладает противовоспалительным, спазмолитическим и диуретическим (мочегонным) действиями:

- Уменьшает воспалительный процесс
- Снимает спазм уретры, что снижает болевую реакцию при мочеиспускании и облегчает отхождение мочи
- Усиливает диурез, что способствует удалению продуктов воспаления

## Профилактика МКБ

1. Регулярный приём **Кантарен®** профилактическими курсами снижает риск возникновения мочекаменной болезни (МКБ)
2. Прием **Кантарен®** во время обострения мочекаменной болезни ускоряет выздоровление
3. Регулярный прием **Кантарен®** профилактическими курсами после обострения мочекаменной болезни снижает риск рецидива, увеличивает сроки ремиссии, вплоть до полного выздоровления
4. Способствует естественному выходу песка и выведению крупных камней (конкрементов) из мочевого пузыря без хирургического вмешательства!

## Способ применения и дозировка

Раствор для перорального применения: внутрь

Разовая доза препарата на одно животное составляет:

0,3 мл на 10 кг массы животного  
(10 капель на 10 кг)

2 раза в день, в течение 2-3 недель

