



ПРЕПАРАТЫ «ХЕЛВЕТ» краткие схемы применения

Группа компаний «Хелвет»
Адрес для переписки:
141700 Московская область,
г. Долгопрудный, а/я 97
он-лайн консультации:
info@helvet.ru, www.helvet.ru



Бесплатный телефон для консультаций:
8-800-33-33-263



СОДЕРЖАНИЕ

- 2 Краткие схемы применения препаратов «Хелвет» для профилактики и лечения болезней домашних животных
- 12 Описание препаратов Хелвет
- 22 Форма выпуска
- 22 Дозировки
- 23 Способы введения
- 23 Условия хранения
- 24 Послесловие

ВНИМАНИЕ!

Данный справочник не является пособием по самолечению. При наступлении несчастного случая, травмы или появлении симптомов какого-либо заболевания следует незамедлительно обратиться к ветеринарному врачу!

КРАТКИЕ СХЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ «ЖЕЛВЕТ» ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНЕЙ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

Агалактия (отсутствие молока у кормящей самки)

ОВАРИОВИТ 1 раз в день 3-4 раза в неделю.

Адаптация к новым условиям

ФОСПАСИМ 1 раз в день. Курс 7-14 дней, начало курса – за 1-2 дня до наступления стрессовой ситуации.

Алопеция

При облысении вследствие нарушения обмена веществ – ЛИАРСИН 2 раза в день в течение 1 месяца.

При наличии воспаления – ТРАВМАТИН + ЭВИНТОН 1-2 раза в день. Курс 7-10 дней.

Анэстрия (отсутствие половых циклов у взрослых самок)

ОВАРИОВИТ 1 раз в день 2-3 раза в неделю. Курс 4-5 недель.

При необходимости повторение курса через шесть месяцев.

Артрит

ТРАВМАТИН + ХОНДАРТРОН (можно в одном шприце) 2-3 раза в день в течение 10-14 дней. ХОНДАРТРОН-ГЕЛЬ местно 2-3 раза в день.

При сильной болезненности АНАЛЬГИВЕТ первые 5 дней с интервалом между инъекциями 24 часа (1 раз в сутки), далее с интервалом между инъекциями 48 часов (через день) в течение 2 недель.

Артроз

ХОНДАРТРОН 1 раз в день + КАФОРСЕН 2-3 раза в неделю. Курс 1 месяц. ХОНДАРТРОН-ГЕЛЬ местно.

При болезненности, хромоте АНАЛЬГИВЕТ первые 5 дней с интервалом между инъекциями 24 часа (1 раз в сутки), далее с интервалом между инъекциями 48 часов (через день) в течение 2 недель.

Бактериальные инфекции (колибактериоз, стафилококкоз и пр.)

ЭВИНТОН* 2-3 раза в день. Курс 10-14 дней.

Беременность

ЭЛВЕСТИН двумя курсами по 14 дней в первую и вторую половину беременности

Бронхит

ЛОБЕЛОН 1-2 раза в день. Курс 1-2 недели.

Бронхиальная астма

ЛОБЕЛОН 1 раз в день или через день. Курс 2-3 недели. При необходимости курс повторить.

Бронхопневмония

ЛОБЕЛОН 1-2 раза в день. Курс 1-2 недели.

Бурсит

ТРАВМАТИН + ХОНДАРТРОН (можно в одном шприце) + ХОНДАРТРОН-ГЕЛЬ местно 2-3 раза в день. Курс 10-14 дней.

Вагинит

МАСТОМЕТРИН 1-2 раза в день. Курс 5 дней.

Вирусные инфекции* (чума плотоядных, ринотрахеит, калицивироз, питомниковый кашель и пр.)

ЭВИНТОН 2-3 раза в день. Курс 10-14 дней.

Вирусный папилломатоз

ЭВИНТОН 5-6 инъекций с интервалом 3-5 дней.

Вязка

Для нормализации гормонального фона и повышения процента оплодотворения ОВАРИОВИТ. Собакам: 1 раз в три дня с первого дня течки; кошкам: через день. Последняя инъекция – в день последней вязки

Гастрит, гастроэнтерит острые

ВЕРАКОЛ 2-3 раза в день. Курс 3-5 дней.

Гематома ушной раковины

При первых признаках гематомы ушной раковины ТРАВМАТИН 1-2 раза в день, ТРАВМА-ГЕЛЬ местно.

Гепатит

КОВЕРТАЛ 1-2 раза в день. Курс 14 дней.

Гепатоз

КОВЕРТАЛ 1 раз в день. Курс 3-4 недели.

Гипоалактация (недостаток молока у лактирующих самок)

ОВАРИОВИТ 1-2 раза в день 3-4 раза в неделю.

Гипофункция яичников

ОВАРИОВИТ 1 раз в день 2-3 раза в неделю. Курс 4-5 недель.

Повторение курса через шесть месяцев.

Грибковые инфекции* (микроспория, трихофития)

ЭВИНТОН 2-3 раза в день. Курс 10-14 дней.

Дерматит atopический

КУРТИКОЛ 2 раза в сутки в течение 4-6 недель

Дерматит контактный, аллергический, пододерматит, острый дерматит (при любых заболеваниях кожи, сопровождающихся зудом и покраснением)

КУРТИКОЛ 1-2 раза в сутки в течение 5-7 дней,

далее 1 раз в сутки в течение 1-2 недель

Диарея

у новорожденных – Элвестин по 1 капле 1 раз в день.

Курс – 10-14 дней.

возраст 1-12 месяцев – ВЕРАКОЛ 2-4 раза в день.

Курс 5-10 дней. Или ЭЛВЕСТИН 1 раз в день. Курс 10-14 дней.

взрослые животные – ВЕРАКОЛ + ЛИАРСИН

(можно в одном шприце) 2-3 раза в день. Курс 5-10 дней.

При подозрении на инфекционную природу диареи в схему добавляется ЭВИНТОН 1-2 раза в день.

Жировая дистрофия печени

КОВЕРТАЛ 2-3 раза в неделю. Курс 3-4 недели.

Задержание последа

МАСТОМЕТРИН 1-2 инъекции

(интервал между инъекциями 24-48 часов).

Запор

ЛИАРСИН 1-2 раза в день. Курс 2-4 недели

Зуд

КУРТИКОЛ 1-2 раза в сутки в течение 5-7 дней,

далее 1 раз в сутки в течение 1-2 недель.

Иммунитета стимуляция

ЭЛВЕСТИН 1 раз в день. Курс 14 дней.

Интоксикация*

КОВЕРТАЛ 1 раз в день + КАНТАРЕН 2 раза в день.

Курс 10-14 дней.

Инф. и инвазионные заболевания, сопровождающиеся поражением печени* (пироплазмоз, вирусный гепатит, лептоспироз и пр.)

КОВЕРТАЛ 1 раз в день. Курс 2-3 недели

Колит

ЛИАРСИН 1-2 раза в день. Курс 2-4 недели.

Ларинготрахеит*

ЛОБЕЛОН 1-2 раза в день. Курс 10-14 дней. При вирусной этиологии - дополнительно Эвинтон 2-3 раза в день.

Ложенная беременность

ОВАРИОВИТ 1 раз в день. Курс 6-7 дней. Затем 2 раза в неделю (всего 4-8 инъекций).

Мастит

МАСТОМЕТРИН 1-2 раза в день. Курс 5-10 дней. ТРАВМА-ГЕЛЬ местно. При сильном покраснении и отечности – ТРАВМАТИН 1-2 раза в день в течение 3-4 дней.

Миозит

АНАЛЬГИВЕТ первые 5 дней с интервалом между инъекциями 24 часа (1 раз в сутки), далее с интервалом между инъекциями 48 часов (через день) в течение 2 недель.

Мочекаменная болезнь*

ТРАВМАТИН + КАНТАРЕН 2 раза в день. В тяжелых случаях – КАНТАРЕН 3 раза в день. Курс 7 дней. Затем 1 раз в день. Курс 7-10 дней. Далее КАНТАРЕН 1 раз в день + ЛИАРСИН 1 раз в день. Курс 1 месяц.

Нарушение половых циклов

ОВАРИОВИТ 1 раз в день 2-3 раза в неделю. Курс 4-5 недель. Повторение курса через шесть месяцев.

Неврозы, тревожные состояния

ФОСПАСИМ 1-2 раза в день. Курс 10-14 дней. При хронических состояниях курс – до 1 месяца.

Нефрит*

КАНТАРЕН (в качестве вспомогательной терапии) 2 раза в день. Курс 2-4 недели.

Облысение

см. Алопеция

Ожоги

ТРАВМАТИН 1 раз в день при ожогах 1-й степени и 2-3 раза в день при ожогах 2-й и 3-й степени. ТРАВМА-ГЕЛЬ местно на пораженные участки.

Остеосинтез (после операции)

АНАЛЬГИВЕТ 2 раза в день в течение 2-4 дней + ХОНДАРТРОН 2-3 раза в день в течение 10-14 дней + КАФОРСЕН 1 раз в день в течение 2-4 недель.

Остеохондропатия

КАФОРСЕН 1 раз в день. Курс 2-3 недели. + ХОНДАРТРОН 1-2 раза в день. Курс 3-4 недели.

Отравление

ЛИАРСИН 1-2 раза в день + ВЕРАКОЛ 2-3 раза в день. Курс 7-10 дней. При наличии рвоты препараты назначаются только в виде инъекций!

Отставание в росте

ЭЛВЕСТИН 1 раз в день. Курс 14 дней.

Отсутствие сосательного рефлекса у новорожденных

ТРАВМАТИН внутрь по 3-5 капель каждые 20-30 минут до нормализации состояния.

Отсутствие течи

см. Анэстрия

Панкреатит*

ПАНКРЕАЛЕКС 1-2 раза в день в течение 5-7 дней, затем 3-4 инъекции 1 раз в 1-3 дня. При сильной болезненности АНАЛЬГИВЕТ 1-2 раза в день в течение 4-6 дней.

Парапроктит

ТРАВМА-ГЕЛЬ местно после опорожнения желез.

Переломы и трещины костей

ТРАВМАТИН 2-3 раза в день 3-7 дней + АНАЛЬГИВЕТ первые 5 дней с интервалом между инъекциями 24 часа (1 раз в сутки), далее с интервалом между инъекциями 48 часов (через день) в течение 2 недель. Курс 3-5 дней. Затем КАФОРСЕН 1 раз в день в течение 1 месяца.

Пиодермия вторичная, хроническая рецидивирующая пиодермия

КУРТИКОЛ в составе комплексной терапии 1-2 раза в сутки в течение 2-6 недель

Пироплазмоз

КОВЕРТАЛ (в восстановительный период, в качестве профилактики последствий применения гепатотоксичных препаратов) 1-2 раза в день. Курс 2-3 недели.

Плохой аппетит

ЭЛВЕСТИН 1 раз в день. Курс 14 дней.

Послеоперационные раны

ТРАВМАТИН 2 раза в день. Курс 3-7 дней. ТРАВМА-ГЕЛЬ местно.

Послеродовые психозы

ФОСПАСИМ подкожно при первых признаках возбуждения. Курс 1 неделя. КАФОРСЕН 1 раз в день. Курс 10-14 дней.

Профилактика:

• «возрастных» заболеваний

ЛИАРСИН 2 раза в день в течение 3-4 недель. Курс проводится 2-3 раза в год.

• инфекционных заболеваний

ЭВИНТОН при угрозе заражения. Курс 5-7 дней.

• дисплазии

ХОНДАРТРОН 1 раз в 2-3 дня, начиная с 6-7 месячного возраста. Курс 2-3 месяца.

• ложной беременности

ОВАРИОВИТ 1 раз в 3-4 дня через 1 месяц после окончания течи. Курс 4-6 недель.

- **мочекаменной болезни**
КАНТАРЕН + ЛИАРСИН 1 раз в день. Курс 3-4 недели.
Периодичность курса – 2-4 раза в год.
- **нарушений обмена веществ**
ЭЛВЕСТИН внутрь или с кормом 1 раз в день.
Курс 10-14 дней.
- **обострений хронических заболеваний ЖКТ и печени**
ЭЛВЕСТИН внутрь или с кормом 1 раз в день. Курс 10-14 дней.
- **поведенческих нарушений**
ФОСПАСИМ 1-2 раза в день. Курс от 1-2 введений до 14 дней.
- **послеродовых осложнений**
МАСТОМЕТРИН одно- или двукратно после родов.
- **поствакцинальных осложнений**
ЭВИНТОН 1 инъекция за неделю до вакцинации и 1 инъекция в день вакцинации подкожно. Или капли в течение недели перед вакцинацией.
- **посткастрационных осложнений у самок**
ОВАРИОВИТ 1 раз в 3 дня в течение 1 месяца после операции.
- **расстройств пищеварения (при смене корма/типа кормления или после дегельминтизации)**
ЭЛВЕСТИН внутрь или с кормом 1 раз в день.
Курс 10-14 дней.
- **рахита**
КАФОРСЕН 1 раз в день в течение месяца.
- **сезонных обострений заболеваний суставов**
ХОНДАРТРОН 1-2 раза в день. Курс 2-4 недели.
Повторение курса 2-4 раза в год.
- **эклампсии**
КАФОРСЕН, начиная со второй недели после родов 1 раз в день. Курс 3-4 недели. + ЛИАРСИН ежедневно в течение 2-3 недель после родов.
- **эмбриональной смертности**
ОВАРИОВИТ на 5 и 10 день после последней вязки.

Простатит

КАНТАРЕН 1-3 раза в день в течение 2-3 недель + ТРАВМАТИН 1-2 раза в день в течение 5-7 дней.

Ранения, ушибы

ТРАВМАТИН + ТРАВМА-ГЕЛЬ в течение 3-7 дней.
При болезненности АНАЛЬГИВЕТ первые 5 дней с интервалом между инъекциями 24 часа (1 раз в сутки), далее с интервалом между инъекциями 48 часов (через день) в течение 2 недель.

Расстройства пищеварения

ЛИАРСИН + ВЕРАКОЛ 2-3 раза в день.

Рахит, остеомаляция, остеопороз

КАФОРСЕН 1 раз в день. Курс 2-3 недели.

Рвота

ПАНКРЕАЛЕКС 1-2 раза в день в течение 5-7 дней.

Ринит

ЭВИНТОН 1 раз в день в течение 5 дней + ТРАВМАТИН по 2-3 капли в глаза или в нос 2 раза в день до улучшения состояния.

Роды

В начале родов (начало видимых потуг) ТРАВМАТИН однократно. При необходимости инъекцию можно повторить через 3-4 часа. При невозможности сделать инъекцию ТРАВМАТИН внутрь каждые 15-20 минут в течение 1-2 часов.

Синовит

ТРАВМАТИН + ХОНДАРТРОН + ХОНДАРТРОН-ГЕЛЬ местно 2-3 раза в день. Курс 10-14 дней.

Страх одиночества

ФОСПАСИМ 1-2 раза в день. Курс 7-14 дней.

Стресс

ФОСПАСИМ 1 раза в день за 1-2 дня до наступления стрессовой ситуации. Курс — от 2-3 кратного приема до 7-14 дней.

Тепловой удар*

ТРАВМАТИН подкожно или внутрь при первых признаках

Токсикоз беременности

ЭЛВЕСТИН 1 раз в день во вторую половину беременности.
Курс 14 дней.

Токсическое поражение печени

КОВЕРТАЛ 1-2 раза в день. Курс 14 дней.

Травмы

ТРАВМАТИН + ТРАВМА-ГЕЛЬ в течение 3-7 дней.
При болезненности АНАЛЬГИВЕТ первые 5 дней с интервалом между инъекциями 24 часа (1 раз в сутки), далее с интервалом между инъекциями 48 часов (через день) в течение 2 недель.

Травма глаза*

ТРАВМАТИН закапывать в глаз 3-4 раза в день и подкожно 1-2 раза в день.

Транспортировка (при боязни транспорта)

ФОСПАСИМ 1-2 раза в день. Курс от 1-2 введенных до 14 дней.

Транспортировка (при укачивании)

ЛИАРСИН 2-3 раза в день за два дня до поездки и в день поездки.

Уретрит

КАНТАРЕН 2-3 раза в день. Курс 7-10 дней.

Фобии

(боязнь шумов, фейерверков, грозы, выстрелов и пр.)

ФОСПАСИМ. От однократного применения до 14 дней.

Хронические болезни ЖКТ

(колит, панкреатит, гастроэнтерит и пр.)

ЛИАРСИН + ВЕРАКОЛ 1-2 раза в день. Курс 2-4 недели.

Хронические и дегенеративные заболевания опорно-двигательного аппарата* (артроз, остеоартроз, спондилез и пр.)

ХОНДАРТРОН 3-4 раза в неделю. Курс 3-4 недели. +
ХОНДАРТРОН-ГЕЛЬ местно.

Цистит

КАНТАРЕН 2-3 раза в день. Курс 7-10 дней.

Экзема*

ЛИАРСИН 1-2 раза в день. Курс 10-14 дней.

Эндометрит острый

МАСТОМЕТРИН 1-2 раза в день в течение 14 дней +
ОВАРИОВИТ 1 раз в день или через день в течение 10-14 дней.

Эндометрит хронический

ОВАРИОВИТ 1-2 раза в неделю в течение 3 недель +
МАСТОМЕТРИН 1-2 раза в день в течение 10-14 дней

Энтерит, энтероколит

ВЕРАКОЛ 1-3 раза в день в течение 10-14 дней.
При болезненности и спазмах АНАЛЬГИВЕТ
1-2 раза в день в течение 2-4 дней.

* - в составе комплексной терапии

ОПИСАНИЕ ПРЕПАРАТОВ ХЕЛВЕТ

АНАЛЬГИВЕТ (р-р для инъекций)

Состав:
Aconitum napellus, Apis mellifica, Arnica montana, Atropa belladonna,
Bellis perennis, Hamamelis virginiana, Urtica urens

Действия

- Анальгетическое
- Противовоспалительное

Показания к применению

1. Заболевания опорно-двигательного аппарата (ОДА), сопровождающиеся воспалением и болью:
 - Миозит
 - Артрит
 - Остеоартроз
 - Рассекающий остеохондрит
 - Тендовагинит
 - Дисплазия тазобедренного сустава
 - Дископатия и др
2. Послеоперационный период
3. Воспалительное заболевание кишечника
4. Онкологические пациенты

ВЕРАКОЛ® (р-р для инъекций, р-р для перорального применения)

Состав:
Podophyllum, Acidum arsenicosum, Citrullus Colocinthis, Veratrum album

Действия

- Регулирует перистальтику желудочно-кишечного тракта
- Противовоспалительное действие на слизистую оболочку кишечника
- Спазмолитическое
- Умеренное желчегонное

Показания к применению

- Гастрит
- Гастроэнтерит
- Спастический колит
- Рвота
- Пищевое отравление
- Диспепсия
- Диарея

КАНТАРЕН® (р-р для инъекций, р-р для перорального применения)

Состав:
Berberis vulgaris, Lytta vesicatoria, Hepar sulfur, Cuprum arsenicosum

Действия

- Противовоспалительное
- Спазмолитическое
- Диуретическое
- Уменьшает кристаллизацию солей в нижнем отделе мочевыводящих путей

Показания к применению

- Уретрит, цистит
- Мочекаменная болезнь
- Почечная колика
- Уретральный синдром
- Нефротический синдром

КАФОРСЕН® (р-р для инъекций, р-р для перорального применения)

Состав:
Calcium carbonicum, Calcium phosphoricum, Calcium fluoricum,
Silicea, Phosphorus

Действия

- Корректирует минеральный обмен (фосфорно-кальциевый, магниевый, кремниевый)
- Повышает активность остеобластов и фибробластов
- Способствует правильному формированию скелета

- Стимулирует регенерацию костной ткани при травмах опорно-двигательного аппарата (трещины, переломы костей)
- Предотвращает развитие остеомалации и остео дистрофии

Показания к применению

- Рахит (профилактика и лечение)
- Остеомаляция (профилактика и лечение в период беременности и лактации)
- Остеопороз
- Переломы и болезни костей (в составе комплексной терапии)
- Эклампсия послеродовая (профилактика)
- Профилактика и лечение нарушений минерального обмена веществ у животных «проблемных» пород: собаки хондро-дистрофичных (например, такса), а также гигантских и миниатюрных пород; кошки крупных пород (мейн-кун, британская, скотиш-фолд), пород сиамо-ориентальной группы, гибридных пород и т.п.

КОВЕРТАЛ® (р-р для инъекций)

Состав:
Chelidonium, Lycopodium, Veronica, Carduus,
Citrullus Colocynthis, Taraxacum

Действия

- Гепатопротекторное
- Желчегонное (антихолестатическое)
- Противовоспалительное
- Метаболическое
- Восстанавливает детоксикационную функцию печени

Показания к применению

- Острые и хронические гепатиты
- Токсические поражения печени
- Жировая дегенерация печени
- Инвазионные и инфекционные заболевания печени (в составе комплексной терапии)
- Отравления
- Пироплазмоз (в восстановительный период)

КУРТИКОЛ (р-р для инъекций, р-р для перорального применения)

Состав:

Apis mellifica, Arnica montana, Atropa belladonna, Bellis perennis,
Hamamelis virginiana, Urtica urens

Действия

- Противовоспалительное
- Противозудное

Показания к применению

- Аллергический дерматит
- Контактный дерматит
- Атопический дерматит
- Воспалительные заболевания кожи, сопровождающиеся зудом и воспалением

ЛИАРСИН®

(р-р для инъекций, р-р для перорального применения)

Состав:

Acidum arsenicosum, Lycopodium, Phosphorus

Действия

- Регулирует обмен веществ
- Восстанавливает нарушенные функции печени
- Улучшает работу желудочно-кишечного тракта
- Положительно влияет на функциональное состояние поджелудочной железы
- Предотвращает дегенеративно-дистрофические процессы в слизистой оболочке кишечника
- Улучшает состояние кожного покрова

Показания к применению

- Профилактика и лечение заболеваний, связанных с нарушениями обмена веществ
- Профилактика и лечение заболеваний ЖКТ (гастрит, гастроэнтерит, диспепсия, кишечный дисбактериоз, колит, запор)
- Отравления
- Острые и хронические заболевания кожи

(крапивница, фурункулез, мокнущие экземы, дерматиты, дерматозы), в т.ч. обусловленные пищевой аллергией

- Профилактика «возрастных» заболеваний

ЛОБЕЛОН (р-р для инъекций)

Состав:

Lobelia inflata; *Apis mellifica*; *Tartarus stibiatus*; *Vincetoxcum officinale*; *Atropa belladonna*; *Lycopodium clavatum*; *Ipecacuanha*; *Sambucus nigra*; *Kalium bichromicum*; *Ferrum phosphoricum*; *Echinacea purpurea*; *Acidum formicum*; *Hepar sulfuris*

Действия

- Противокашлевое
- Регулирует продукцию бронхиальной слизи
- Противовоспалительное
- Улучшает лёгочную вентиляцию

Показания к применению

- Трахеобронхит
- Бронхит
- Ларинготрахеит
- Бронхопневмония
- Бронхиальная астма

МАСТОМЕТРИН® (р-р для инъекций)

Состав: *Lachesis mutus*, *Juniperus sabina*, *Pulsatilla*, *Sepia*, АСД-2

Действия

- Противовоспалительное
- Повышает сократительную способность матки
- Стимулирует выработку эндогенного окситоцина
- Стимулирует регенерацию слизистых оболочек половых путей

Показания к применению

- Острый и хронический эндометрит
- Вагинит
- Задержание последа
- Профилактика послеродовых осложнений
- Мастит

ОВАРИОВИТ® (р-р для инъекций)

Состав:

Calcium carbonicum, *Aquilegia*, *Pulsatilla*, *Sepia*, *Turnera diffusa*, *Aurum iodatum*, *Aristolochia*

Действия

- Нормализует половой цикл
- Регулирует функцию яичников
- Восстанавливает гормональный статус организма
- Стимулирует выработку гонадотропных гормонов

Показания к применению

- Нарушения полового цикла
- Ложная беременность
- Последствия гормональной терапии
- Профилактика эмбриональной смертности
- Гиперфункция яичников
- Гипофункция яичников
- Кистозное перерождение яичников
- В качестве дополнительного средства при воспалительных процессах в матке (эндометрит)
- Повышение вероятности оплодотворения
- Бесплодие самок (вызванное гормональными нарушениями)
- Посткастрационный синдром самок (недержание мочи, дерматозы, ожирение)

ПАНКРЕАЛЕКС (р-р для инъекций)

Состав:

Atropa belladonna, *Berberis vulgaris*, *Calcium carbonicum*, *Hahnemanni*, *Lycopodium clavatum*, *Matricaria recutita*, *Taraxacum officinalis*

Действия

- Противовоспалительное
- Панкреопротекторное
- Противорвотное

Показания к применению:

- Панкреатит (острый и хронический)
- Триадит

- Устранение симптомов рвоты (при панкреатите и триадите)
- Восстановление экзокринной функции поджелудочной железы (улучшение пищеварения)

ТРАВМАТИН® (р-р для инъекций)

Состав:
Echinacea purpurea, Matricaria recutita, Calendula, Arnica, Hypericum,
Hepar sulfuris, Belladonna, АСД-2

Действия

- Противовоспалительное
- Снимает посттравматический отёк
- Снижает болевую чувствительность
- Уменьшает капиллярное кровотечение
- Стимулирует регенерацию тканей

Показания к применению

- Травмы любого происхождения (ушибы, растяжения, переломы, гематомы и пр.)
- Повреждения кожных покровов и наружные раны (в том числе, операционные)
- Тепловой удар, обморожения
- Острые воспалительные процессы, сопровождающиеся болевой реакцией
- Родовой процесс
- Отсутствие сосательного рефлекса у новорожденных

ТРАВМА-ГЕЛЬ® (гель для наружного применения)

Состав:
Echinacea purpurea, Matricaria recutita, Calendula, Arnica, АСД-2,
Belladonna, Hypericum, Hepar sulfuris

Действия

- Останавливает капиллярное кровотечение
- Способствует рассасыванию травматических отеков и гематом
- Обладает выраженным противовоспалительным эффектом
- Способствует быстрой регенерации поврежденной ткани

- Препятствует развитию септического процесса
- Снижает болевую чувствительность

Показания к применению

- Повреждения кожных покровов
- Обработка послеоперационных швов
- Гематомы, ушибы, растяжения, посттравматические отеки
- Острое воспаление (отиты, дерматиты, маститы и пр.)
- Роды, родовые травмы

ФОСПАСИМ® (р-р для инъекций, раствор для перорального применения)

Состав: Phosphorus, Aconit, Hyosciamus, Passiflora, Moshus, Ignatia, Platina

Действия

- Успокаивающее
- Противотревожное
- Антистрессовое
- Антипсихотическое
- Улучшает ориентировочные реакции
- Позволяет животному быстрее адаптироваться к новым условиям
- Способствует выработке новых форм поведения, адекватных данной ситуации (в том числе при дрессировке)
- Пролонгирует действие средств, используемых для наркоза

Показания к применению

- Нормализация эмоционально-психологического состояния животных
- Транспортировка, визит к ветеринарному врачу
- Расставание с хозяином
- Подготовка к соревнованиям и выставкам
- Пугливость, тревожность, агрессивность
- Боязнь шумов, взрывов, фейерверков
- Премедикация (седация животных перед введением средств для наркоза)

ХОНДАРТРОН® (р-р для инъекций, раствор для перорального применения)

Состав:
Rhododendron, Rhus toxicodendron, Ledum, Symphitum, Causticum, Calcium fluoricum, Apis, Lithium carbonicum, Sulfur, Comarum palustre

Действия

- Хондропротекторное
- Противовоспалительное
- Обезболивающее
- Улучшает питание кровоснабжение соединительной ткани
- Предотвращает дальнейшее разрушение хряща и деформацию сустава
- Стимулирует процессы регенерации хрящевой ткани

Показания к применению

- Бурсит, синовит, тендовагинит
- Острый и хронический артрит
- Артроз
- Дисплазия тазобедренного сустава (в составе комплексной терапии)
- Остеоартриты
- Растяжения связок
- Дегенеративно-воспалительные заболевания суставов и позвоночного столба (в составе комплексной терапии)
- После оперативного вмешательства в суставах и сухожильно-связочном аппарате

ХОНДАРТРОН-ГЕЛЬ® (гель для наружного применения)

Состав:
Rhododendron, Rhus toxicodendron, Ledum, Symphitum, Causticum, Calcium fluoricum, Apis, Lithium carbonicum, Sulfur, Comarum palustre

Действия

- Противовоспалительное
- Обезболивающее
- Трофическое (улучшает питание и кровоснабжение соединительной ткани)

Показания к применению

- Бурсит, синовит, тендовагинит
- Артрит
- Артроз
- Остеоартрит
- Растяжения связок
- Дегенеративно-воспалительные заболевания суставов и позвоночного столба

ЭВИНТОН® (р-р для инъекций)

Состав: Thuja, Vincetoxicum, Echinacea purpurea

Действия

- Иммуномодулирующее
- Снижает риск поствакцинальных осложнений
- Укрепляет иммунитет, повышает защитные силы организма

Показания к применению

- Неспецифическая профилактика и лечение заболеваний бактериальной и вирусной этиологии (в составе комплексной терапии): инфекционный ринотрахеит, чума плотоядных, вирусный гастроэнтерит и пр.
- Коррекция иммунного статуса, в том числе при хронических кожных заболеваниях, аллергических и аутоиммунных состояниях
- Профилактика поствакцинальных осложнений

ЭЛВЕСТИН® (раствор для перорального применения)

Состав:
Thuja, Vincetoxicum, Echinacea purpurea, Lycopodium, Acidum arsenicosum, Phosphorus, Podofilum, Citrullus colocynthis, Veratrum album, Se

Действия

- Антиоксидант
- Нормализует обмен веществ
- Регулирует перистальтику желудочно-кишечного тракта
- Оказывает регулирующее действие на функции печени
- Укрепляет иммунитет
- Стимулирует рост и развитие молодняка

Показания к применению

- Беременность (профилактика эмбриональной и неонатальной смертности, токсикоза, нарушений обмена веществ)
- Искусственное вскармливание
- Введение прикорма, смена рациона
- Отставание в росте
- Дегельминтизация

ФОРМЫ ВЫПУСКА

Растворы для инъекций – стеклянные флаконы по 100 и 10 мл.

Растворы для перорального применения – пластиковые флаконы-капельницы по 20 мл.*

Гели для наружного применения – пластиковые флаконы по 20 (Травма-гель), 75 и 500 мл (Травма-гель, Хондартрон-гель).

** Все таблетки заменены на растворы для перорального применения*

ДОЗИРОВКИ

Растворы для инъекций:

0,1 мл на 1 кг веса животного (мин. 0,5 мл, макс. 5,0 мл)

Растворы для перорального применения:

10 капель на 10 кг веса животного

Фоспасим:

СОБАКИ - 2 капли/1 кг массы животного

КОШКИ - 3 капли/1 кг массы животного

ДЕКОРАТИВНЫЕ ГРЫЗУНЫ - 2-3 капли на животное

СПОСОБЫ ВВЕДЕНИЯ

Для удобства применения препараты «Хелвет» выпускаются в различных лекарственных формах: растворы для инъекций, растворы для перорального применения (капли) и наружные средства (гели).

Все препараты «Хелвет» сочетаются как между собой, так и с другими лекарствами.

Инъекционные формы препаратов вводятся подкожно или внутримышечно.

Растворы для перорального применения (капли) закапывают непосредственно в рот животному.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Препараты «Хелвет» необходимо хранить при температуре от 0 до 30 °С в защищенном от прямых солнечных лучей и недоступном для детей месте.

Срок годности при соблюдении условий хранения:

растворы – 3 года

гели – 2 года

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Почти в каждом доме есть аптечка.

В ней – средства оказания первой помощи и необходимые лекарства от хронических болезней членов семьи.

А у ваших домашних любимцев должна быть своя аптечка – ветеринарная.

Ведь большинство препаратов, предназначенных для людей, совершенно не подходит для животных, а некоторые из них просто опасны для их жизни.

С осторожностью следует относиться и к сильнодействующим ветеринарным препаратам.

Распространенное выражение

«одно лечим – другое калечим» как нельзя более точно характеризует действие многих из них.

Именно поэтому все больше заводчиков и владельцев животных обращаются к помощи средств гомеопатических, которые так же эффективны, но при этом не оказывают побочных действий.

Препараты «Хелвет» безопасны, не накапливаются в органах и тканях и, при соблюдении правил применения, могут использоваться даже в период беременности и с первых дней жизни.

Тем не менее, перед применением всегда предварительно проконсультируйтесь с ветеринарным врачом.